



ЯК ЗАХИСТИТИ ДІТЕЙ ВІД КОРУ

Безпека життя дітей — відповідальність батьків

В УКРАЇНІ ТРИВАЄ НАЙБІЛЬШИЙ СПАЛАХ КОРУ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!




2018 року майже **55 000 людей** у різних регіонах України захворіли на кір.

Унаслідок цього померли 16 людей, серед яких 12 дітей. Головна причина — низьке охоплення щепленнями.

Найбільше хворіють на кір у тих областях, де рівень планової вакцинації найменший.

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КІР В УКРАЇНІ* ЗА 3 ТИЖНІ 2019 РОКУ



СЕРЕД ПОМЕРЛИХ — 8-МІСЯЧНЕ НЕМОВЛЯ!



Дитина ще не отримала першої дози вакцини. Її наразили на небезпеку безвідповідальні батьки та оточення, які не мали щеплення і стали джерелом поширення інфекції.

Нині у Львівській області **близько 30 000 дітей до 18 років** не мають необхідної кількості щеплень КПК. За статистикою цього спалаху (з 2017 р.), на 5 000 хворих маємо один летальний наслідок.

Кожна нещеплена дитина є мішенню захворювання, і кожен день її життя без щеплення лише підвищує ризик захворіти.

КІР: СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ І ШВИДКИЙ




Кір — надзвичайно заразний, він дуже швидко передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях **до двох годин** після того, як хвора людина залишила приміщення. Заразитися можна всюди.

9 із 10 неімунізованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені.

Спеціального лікування від кору нема. Єдиний захист — вакцинація.

ДВІ ДОЗИ ВАКЦИНИ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД КОРУ



Вакцинація формує специфічний імунітет, унаслідок чого організм людини стає нечутливим до захворювання. Згідно з українським Календарем щеплень, **у 12 місяців** роблять перше щеплення від кору, а **в 6 років** — планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від недуги.

ВАКЦИНА КПК: БЕЗПЕЧНА ТА ЕФЕКТИВНА



Вакцина проти кору забезпечує тривалий захист від кору, паротиту і краснухи. В Україні застосовують дві вакцини, гарантовані державою: **«Пріорикс»/Priorix, вироблена компанією Glaxosmithkline Biologicals S.A. (Бельгія), та «М-М-Р II»/M-M-RII, вироблена компанією Merck & Co., Inc. (США).**

Обидві вакцини — безпечні, ефективні та якісні, прекваліфіковані ВООЗ, найавторитетнішою організацією світу в сфері охорони здоров'я.

Вакцини закуплені державою та надаються безкоштовно!

ВИ МОЖЕТЕ ЗАХИСТИТИ СВОЇХ ДІТЕЙ ВЖЕ ЗАРАЗ!



Дитині шість чи більше років, і вона не має жодного щеплення КПК?
У такому разі треба зробити два щеплення з інтервалом, не меншим
за один місяць.

Ви не пам'ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте
документальних підтверджень? У цьому випадку дитину також
потрібно вакцинувати.

Ви не впевнені у достовірності записів про щеплення вашої дитини?
Зверніться до лікаря для щеплень або дайте згоду на вакцинацію у школі!

Фальшива довідка може спричинити смерть!

ЯК МОЖНА ВАКЦИНУВАТИ ДИТИНУ?

Задля протидії поширенню захворювання у Львівській області



Звернутися із дитиною
до центру первинної
медико-санітарної допомоги
і там отримати необхідні
щеплення КПК.



Надати інформовану згоду на здійснення
щеплення вашої дитини працівниками
мобільних бригад, що діятимуть
у школах (про відповідні заходи буде
повідомлено додатково)



ВБИВЧІ МІФИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

МІФ 1: НЕ ВАРТО ВАКЦИНУВАТИСЯ ПІД ЧАС СЕЗОНУ ГРИПУ

ПРАВДА: ТЕРМІНОВО ПОТРІБНО ВАКЦИНУВАТИ

Не просто варто, а необхідно саме зараз, коли в країні спалах кору! Якщо дитині виповнюється 1 чи 6 років або вона пропустила своє щеплення від кору за графіком раніше.

Немає жодних причин відкладати щеплення від кору через те, що почався сезон грипу. Попри поширений міф, вакцинація не виснажує і не перевантажує імунну систему. Ба більше, вакцинуватися від кору та грипу можна в один день — у різні ділянки тіла. Щеплення значно знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок грипу. За світовими стандартами, застуди з температурою до 38 °C також не є протипоказанням до вакцинації проти кору.

МІФ 2: КРАЩЕ ПЕРЕХВОРИТИ ПРИРОДНИМ ШЛЯХОМ, НІЖ ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ

ПРАВДА: ЗАГАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ НЕ ЗАХИЩАЄ ВІД КОРУ!

Якщо ваша дитина перехворіє на кір, у неї, звісно ж, сформується імунітет проти цього захворювання. Однак інфекція може зумовити дуже серйозні ускладнення, як-от пневмонію та ураження мозку.

Ризик тяжких наслідків (аж до смертельних) інфекційної хвороби набагато вищий за ймовірність незначних реакцій на вакцинацію.

У РАЗІ КОНТАКТУ ІЗ ХВОРИМ САМЕ ВАКЦИНАЦІЯ Є СПОСОБОМ НЕГАЙНОГО ЗАХИСТУ



Такій дитині потрібно якомога швидше ввести дозу вакцини:
у перші 3 доби після контакту. Навіть якщо минуло понад **72 години**
від контакту, все одно варто застосувати КПК якомога раніше.

**МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ
У НАШИХ РУКАХ —
ЗРОБІТЬ ЩЕПЛЕННЯ, ЗАХИСТІТЬ ЇХ
ВІД СМЕРТЕЛЬНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!**